


Fracturile deschise la copil



Fracturile intraarticulare la copil

SUSPECȚIE LA FRACTURI INTRAARTICULARE?

ETAPA PRESPITALICEASCĂ

- Analgezie conform protocolului clinic
- Imobilizarea cu atela Kramer
- Transportarea prin A.M.U. sau alt mijloc de transport

ETAPA SPITALICEASCĂ

- Centre raionale
- Medici traumatologi, chirurghi

CONFIRMAREA DIAGNOZEI

- Examinarea clinică cu aprecierea pulsului și dereglărilor nervoase periferice
- Examinarea radiologică

Fracturi fără șoc traumatic

- Imobilizarea cu atela gipsată
- Analgezia conform protocolului clinic
- Transportarea imediată (în decurs de 12h)

Fracturi cu șoc traumatic

- Terapia antișoc
- Imobilizare cu atela gipsată
- Transportarea pentru stabilizare în decurs de 24h

Spital de nivelul III
Secția de ortopedie și traumatologie

Fracturile, luxatiile de antebrăț la copil

SUSPECȚIE LA FRACTURI, LUXAȚII DE ANTEBRĂȚ?

ETAPA PRESPITALICEASCĂ

- Analgezia conform protocolului clinic
- Imobilizarea cu atela Kramer
- Transportarea prin A.M.U. sau alt mijloc de transport de ocazie

ETAPA SPITALICEASCĂ

- Centre raionale
- Medici traumatologi, chirurghi

CONFIRMAREA DIAGNOZEI

- Examinarea cu aprecierea pulsului și dereglărilor nervoase periferice
- Examinarea radiologică

Fracturi și luxații necomplicate


Fracturi și luxații complicate cu leziuni de nervi și vase, cu alte fracturi

- Repoziția închisă
- Radiograma de control
- Aplicarea de atele gipsate
- Analgezia conform protocolului
- Monitorizarea evoluției

- Aplicarea de atele gipsate
- Analgezia conform protocolului clinic
- Transport prin A.M.U. timp de până la 12h

Spital de nivelul III
Secția de ortopedie și traumatologie

Fracturile de bazin la copil



Fracturile de col femural la copil

SUSPECȚIE LA FRACTURI DE COL FEMURAL?

ETAPA PRESPITALICEASCĂ

- Analgezia conform protocolului clinic
- Imobilizarea cu atele Dihterich sau Kramer
- Transportarea prin A.M.U sau alt mijloc de transport

ETAPA SPITALICEASCĂ

- Centre raionale
- Medici traumatologi, chirurghi

CONFIRMAREA DIAGNOZEI

- Examinarea cu aprecierea pulsului și dereglărilor nervoase periferice
- Examinarea radiologică

Fraktură fără șoc traumatic

- Imobilizarea în aparat coxofemural
- Analgezie
- Transportarea imediată (în decurs de 6-12h)

Fracturi cu șoc traumatic

- Combaterea șocului
- Imobilizarea în aparat gipsat
- Transportarea în decurs de 24h

Spital de nivelul III
Secția de ortopedie și traumatologie