

Sarcina fiziologică și patologică

CIM, Nozologie	Etapă acordării asistenței medicale	Investigațiile	Tratamentul, substanțe, manopere	Doza/ unitatea de măsură	Cantitatea, nr. de prize/ pastile, fiole	Durata tratamentul ui
sarcina fiziologică	Medicina primară	Până la 12 săpt. gestație -masa coporala, talia -tonometria -frotiu vaginal - An. generală a urinii - An. generală a sânge. - RMP, HIV/SIDA - HbsAg la gravide nevaccinate - glucoza în sânge - consult med. fam. - consult ginecologic - consult. stomatologului - consult. ORL - consult. oculistului - Gr sanguină, Rh factor si titrul de Ac la Rh negative - USG 11-13 s.a.+ 6 zile - Dublu test 11-14 s.a. La termenul de sarcină 16-18 săptămâni - consult med. fam. - tonometria - USG 18-21 s.a. cu determinarea lungimii colului uterin - triplu test 15-18 s.a.	Compr. Acidum folicum 0,001	1 compr. x 4 ori/zi	1 flacon	Până la 12 săpt. de sarcină. Pe toată durata sarcinii începînd cu trimestrul II

Sarcina fiziologică și patologică

		La termenul de sarcină 22 – 24 de săptămâni - consult med. fam. - tonometria - înaltimea fundului uterin - BCF - Glicemia simplă - An. gen. de urină La termenul de sarcină 28-30 de săptămâni - consult med. fam. - consult. ginecolog -oferirea conc de maternitate - tonometria - înaltimea fundului uterin - BCF - titru de Ac Rh negative - An. gen. sânge - An. gen. urină - Glicemia - HIV2 și RMP La termenul de sarcină 32 - 33 săptămâni - consult med. fam. - tonometria - IFU - BCF - determ situsului și p. prezent - titru de Ac - urograma - HIV 2	Compr. cu Fe în anemie	1 compr. x 1 dată/zi	3 flacoane	Pe toată durata sarcinii începând cu trimestrul II
--	--	---	------------------------	----------------------	------------	--

Sarcina fiziologică și patologică

		La termenul de sarcină 35 - 36 săptămâni - consult med. fam. - consult ginecologic - masa corpului si talia - tonometria - IFU - BCF - determ situsului si p. prezentate - Titru de Ac - Hemograma - Urograma La termenul de 38 - 40 de săptămâni - consult med. fam. - masa corpului si talia - tonometria, determ situsului si p. - IFU, BCF - consilierea privind sarcina prelungata(41 s.a.)				
0.36 Îngrijirile acordate mamei pentru hipoxia fătului, retard fetal, insuficiența fetoplacentară	Spitalicească	An. generală a urinei An. generală a sângelui RW Frotiul la gn. Insămânțarea din vagin cu antibiograma USG cu Doppler Urocultura cu antibiograma Cardiotocograma	Hexoprenalinum 0,0005%- 2ml Compr. Verapamilum 0,04 Sol. Glucosum 5%-500ml Compr. Dipyridamolum 0,025 Sol. Platyphyllini hydrotartras 0,2%-1ml Spiritus aethylicus 96%-100ml Bumbac Seringi Seringi sisteme de perfuzii Oxibaroterapie	2 ml 1 compr x 3 ori/zi 5%-500 ml 1 compr x 2 ori/zi 0,2%- 1ml x 2 ori/zi 96% -100ml extern 10 ml 5 ml	2 fiole 30-40 compr. 3 flac 16 past. 16 fiole 100ml 100gr 10 buc 5 buc 8 10 ședințe	8 -9 zile

Sarcina fiziologică și patologică

0.99 Anemia	Medicina primară	An. generală de sânge	Compr. cu Fe Compr. Acidum folicum 0,001	1 - 2 compr/zi 3 compr/zi	Îndelungat Îndelungat	8 zile
	Spitalicească	Analiza generală de urină Analiza generală de sânge RW Frotiul la gn. Fe seric, trombocitele Consultația internistului Consultația hematologului	Compr. de Fe Compr. Acidum folicum 0,001 Sol. Acidum ascorbicum 10%-5ml Bumbac Seringi Spiritus aethylicus 96%-100ml	1 -2 compr/zi 3 compr/zi 10%-5ml x 1/zi 10 ml 96%-100ml	16 compr 24 compr 8 fiole 100 gr 10 100ml	
099.5 Bolile aparatului respirator	Spitalicească	Analiza generală a urinii Analiza generală de sânge RW Frotiu la Gn Însămânțare din nazofaringe Însămânțarea sputei la Bk Consultația internistului R-fia plămânilor la indicații ECG	Cefazolinum 1,0 Sol. Aminophyllinum 2,4%-10ml Compr. Bromhexinum 0,008 Compr. Acidum acetylsalicylicum 0,325 Amoxicillinum 1,0 Ceftazidimum 1,0 Bumbac Spiritus aethylicus 96%-100ml Seringi Seringi	1,0 x 3 ori/zi i/m 2,4%-5ml, 1/zi, i/m 1 compr x 3 ori/zi, per os 1 compr/zi 1,0 i/m x 4 ori/zi, i/m 1,0 x 2 ori/zi, i/m 96%-100ml, uz extern 5ml 20ml	15 fiole 5 fiole 5 fiole 24 compr 28 fl 14 fl 100 gr 100 ml 15 10	8 zile
0.40 Polihidramnios	Spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină RW Frotiu la gn Însămânțare din vagin cu antibiograma Urocultura cu antibiograma USG cu Doppler	Compr. Erythromycinum 0,5 Supp. Indometacinum 0,05 Bumbac Spiritus aethylicus 96%-100ml Seringi Seringi Oxibaroterapie	1 compr x 4 ori/zi 1 sup. per rectum/noapte 96%-100ml, extern 5ml 2 ml 7ședințe	10 compr. 8 supp 100 gr 100ml 3 3	7 zile

Sarcina fiziologică și patologică

0.41 Oligoamnios	Spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină RW Frotiu la gn Însămânțare din vagin cu antibiograma Urocultura cu antibiograma USG cu Doppler	Compr. Erythromycinum 0,5 Compr. Valeriana officinalis Bumbac Spiritus aethylicus 96%-100ml Seringi Seringi Oxibaroterapie	1 compr x 4 ori/zi per os 1 compr x 3 ori/zi 96%-100ml 5ml 2ml 7 ședințe	10 compr 24 compr 100gr 100ml 3 16	7 zile
0.23 Patologia renală și sarcina	spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină Urocultura cu antibiograma USG renală Consultația oftalmologului Consultația internistului Consultația urologului (după indicații) Consultația nefrologului (după indicații) Clearance-ul ureei, creatininei Filtratia glomerulară, reabsorbția Proba Neciporencu Proba Zimnițki (după indicații)	Cefazolinum 1,0 Amoxicillinum + Kalii clavulanas 0,6 Compr. Amoxicillinum + Kalii clavulanas 1,0 Sol. Natrii chloridum 0,9%-500ml Sol. Drotaverinum 2%- 2ml Sol. Metamizoli natrium 50%-2ml Sol. Difenhidramină 1%-1ml Acidum acetylsalicylicum 0,5 Compr. Furazidinum 0,05 Compr. Nitroxolinum 0,05 Sisteme de perfuzii Bumbac Spiritus aethylicus 96%-100ml Seringi seringi	1,0 x 3 ori/zi, i/m 0,6 x 3 ori/zi, i/m 1 compr x 2 ori/zi per os 0,9%-500ml i/v perf. 2ml, i/m x 2 ori/zi 50%-2ml, i/m x 2 orizi 1%-1ml, i/m x 2 ori/zi 1 compr/zi 2 compr. x 3 ori/zi per os 2 compr x 4 ori/zi 96%-100ml extern 5ml 10ml	15 fl 21 fl 14 compr 6 fl 16 fiole 14 fiole 14 fiole 7 compr 42 compr 48 compr 6 100 gr 100ml 21 15	8 zile

Sarcina fiziologică și patologică

0.16 Hipertensiune cronică	spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină Frotiu la gn Consultația oftalmologului ECG Protrombina, fibrinogen Proba Zemnițki (după indicații) USG renală Consultația internistului Consultația endocrinologului (la indicații) Biochimia sângelui Pierderea proteinelor/24 ore	Compr. Metildopa 0,25 Sol. Dipyridamolum 1%-1ml Sol. Natrii chloridum 0,9%-500ml T-rae Valeriana officinalis Compr Nifedipinum 0,01 Bumbac Spiritus aethylicus 96%-100ml Seringi Seringi	1 compr x 3 ori/zi per os 1%-1ml, i/m 1/zi 0,9%-500ml i/v perf 30 pic x 3 ori/zi, per os 1 compr. x 3 ori/zi 96%-100ml 5ml 10ml	24 compr 8 fiole 8 fiole 1 fl 24 compr 100gr 100ml 10 10	
0.22 Tromboflebita Boala varicoasă	spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină Frotiu la gn Coagulograma Protrombina, fibrinogen Consultația angiochirurgului Doppler duplex (la necesitate)	Gel Heparini natrium 100 000 U Cefazolinum 1,0 Compr. Dipyridamolum 0,025 Gel Troxerutinum 2%-0,04 Compr. Acidum acetylsalicylicum 0,5 Bumbac Spiritus aethylicus 96%-100ml Seringi	Aplicații locale x 3 ori/zi 1,0 x 3 ori/zi, i/m 1 compr x 2 ori/zi per os Aplicații locale 2-3 ori/zi 1 compr 7zi per os 96%-100ml, extern 5 ml	1 tub 21 fl 16 compr 1 tub 8 compr 100 gr 100ml 3	7-8 zile
0.48 Sarcina supramatura tă	spitalicească	Frotiu la gn USG cu Doppler Amnioscopie Colpocitograma Reticulocitele CTG Aprecierea colului uterin după scorul Bishop	Compr. Misoprostolum 0,2 Bumbac Spiritus aethylicus 96%-100ml Seringi Seringi	Câte 0,025 sublingual x3 96%-100ml, extern 10ml 5ml	1 compr 100gr 100ml 5 5	

Sarcina fiziologică și patologică

099.6 Patologia aparaturii digestiv	spitalicească	Analiza generală de sânge	Sol. Natrii chloridum 0,9%-500 ml	0,9%-500ml i/v perf	10 fl	
		Frotiu la gn	Sol. Drotaverinum 2%-2ml	2%-2ml x 2 ori/zi	5 fiole	
		Biochimia sângelui:	Sol. Metoclopramidum 0,5%- 2ml	2ml i/m, i/v x 2 ori/zi	10 fiole	
		<i>Proba cu timol</i>	Sol. Platyphyllini hydrotartras	0,2%-1ml x 2 ori/zi i/m	10 fiole	
		<i>Glucosa sângelui</i>	0,2%-1ml	100ml	100ml	
		<i>Diastaza, amilaza</i>	Spiritus aethylicus 96%-100ml		100gr	
		<i>Transaminazele</i>	Bumbac	5 ml	20	
		<i>Bilirubina</i>	Seringi	1tab x 2 ori/zi per os	14 caps	
		<i>Fosfataza alcalină</i>	Caps. Pancreatinum	1 compr x 2 ori/zi per os	14 compr	
		RW	Compr. Famotidinum 0,02	Câte 1 ling. de masă x 3	1 fl	
		USG org. interne	Susp. Hidroxid de aluminiu și	ori/zi per os		
		Marcherii hepatitelor virale	hidroxid de magneziu 200ml		5	
		Fibrogiastroduodenoscopia (după indicații)	Sisteme de perfuzii			
		Consultația internistului				

Sarcina fiziologică și patologică

Preeclampsia ușoară	spitalicească	Analiza generală de sânge Trombocitele Urograme Pierderea de proteine /24h Sedimentul urinii zilnic USG cu Doppler Consultația oftalmologului Consultația internistului ECG ÎFU, CA, mișcările fetale zilnic TA 2 ori/zi Masa corporală 1 dată/săpt. CTG continuu	Supraveghere Dacă sunt semne de suferință fetală, inducerea travaliului înainte de termen, până la 34 săptăm., Sol. Dexamethasonum 0,4%-2ml Terapia mamei dacă TA>140/90, proteinurie> 1,0g/l sau unul din semnele: hiperreflexie cu clonus, cefalee persistentă sau dureri în epigastriu trombocitopenie <100x10⁹/l ALAT>50 UI/l Ureea >0,45 mmol/l Sol. Magnesii sulfas 25%-5ml Sol. Natrii chloridum 0,9%-500ml Sol. Dexamethasonum 0,4%-2ml în nașterea prematură, după stabilizarea TA Compr. Nifedipinum 0,01 Methyldopum 0,25 Declanșați nașterea urgent îndată ce se stabilizează starea pacientei, dar nu mai târziu de 24 de ore dacă termenul sarcinii > 34 săptămâni sau <26 săptămâni Compr. Mizoprostolum 0,2	12 mg x 2 ori 40-140ml în funcție de TA 0,9%-500ml 12 mg x 2 ori 10-40mg 500-750mg/24 ore 25 mg sublingual	3 fiole 30 fiole 5 fl 3 fiole 4 compr 3 compr 1 compr.	10 zile
----------------------------	---------------	--	---	---	---	----------------

Sarcina fiziologică și patologică

Preeclampsia severă	spitalicea scă	CTG continuu	Terapia magnezială dacă TA >140/90, proteinurie >1g/l sau unul din următoarele semne:			
		USG cu Doppler	Hiperreflexie cu clonus, cefalee persistentă, sau dereglări vizuale sau dureri în epigastriu			
		Grupa sanguină	Trombocitopenie <100 x 110/l			
		Rh factor	ALAT >50 UI/l			
		Proteina totală	Ureea > 0,45 mmol/l			
		Analiza generală de sânge	Sol. Magnesii sulfas 25%-5 ml	40-140ml în funcție de TA	18 fiole	
		Analiza generală de urină	Sol. Natrii chloridum 0,9%-500ml	0,9%-500ml	3 fl	
		ECG	Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml on nașterea prematură, după stabilizarea TA	3ml x 2ori		
		Consultația oftalmologului	Sol. Diazepamum 0,5%-2ml	2-20ml i/v	3 fiole	
		Consultația internistului	Sol. Dipiridamolum 0,5%-2ml	0,5%-2 ml		
		Consultația neurologului	Compr.Methyldopum 0,25	Cîte 0,5-0,75-2,0 g/24 h	10 fiole	
		Pierderea de proteine în 24 ore	Efecte nedorite (tahicardie, icter hemolitic)		2 fiole	
		Protrombina, fibrinogen	Declanșarea nașterii urgent imediat după stabilizarea pacientei, dar nu mai târziu de 24 ore dacă termenul sarcinii >34 săptăm., sau <26 săptăm.			
		Clearance-ul ureei, creatininei	Anestezie epidurală	0,75-1 mg/zi	9 compr.	
		Creatinina, ureea	Compr. Clonidineum 0,00025	10-40 mg/zi		
		Transaminazele	Compr. Nifedipinum 0,01			
		Trombocitele	Monitorizați diureza:			
		Timpul de coagulare Lee-White	dacă diureza < 30 ml timp de 2 ore inițiați terapia oliguriei on secția de reanimare cu:			
		Timpul de sângerare	Sol. Natrii chloridum 0,9% - 500 ml	0,9%-500ml	2 fl	
			Sol. Hidralazin * 1ml	5,0-20 mg	4 fiole	
			Dacă diureza nu se restabilește repetați medicamentele sus enumerate. Doze mici de:	40-80 mg	4-8 fiole	
			Sol. Dopaminum 0.5%-5ml	0,5%-5ml	2 fiole	

Sarcina fiziologică și patologică

			stabilizați pacienta și finalizați sarcina. În caz de sarcină 26-32 săptăm., dacă permit condițiile maternității – monitorizarea riguroasă a pacientei și fătului poate avea beneficii. Cateterizarea vezicii urinare Bumbac Spiritus aethylicus 96%-100ml Seringi Seringi Seringi Sisteme de perfuzii	96%-100ml 20 ml 10 ml 5 ml	100gr 100ml 5 buc 10 buc 5 buc 4 buc	
0.15 Eclampsia (schema 1)	spitalicească	Analiza generală de sânge Trombocitele Analiza generală de urină Pierderea proteinelor în 24 ore Biochimia sângelui Transaminazele Coagulograma ECG CTG USG cu Doppler (la necesitate) Control TA Controlul diurezei Consultația oftalmologului Consultația neurologului Consultația internistului	Sol. Magnesii sulfas 25%-5 ml Sol. Natrii chloridum 0,9%-10ml Dacă accesul se repetă suplimentar: Sol. Magnesii sulfas 25%-5 ml Sol. Natrii chloridum 0,9%-10ml Sol. Magnesii sulfas 25%-5 ml Sol. Natrii chloridum 0,9%-500ml Sol. Dipiridamolum 0,5%-2ml Antidot la supradozare (frecvența respirației <16/min) Lipsește reflexele rotuliene, Diureza <40ml/h, Ultimele 4 ore: Sol. Calcii chloridum 10%-10ml Sol. Aminophyllinum 2,4%-5ml Sisteme de perfuzii	20ml 20ml 10-15ml timp de 5 min 50-100ml 450ml cu viteză de 40ml/h 0,5%-2ml 1ml/min până la restabilirea respirației 2,4%-5ml	4 fiole 4 fiole 3 fiole 1 fiolă 2 fl 2-3 fiole 5 fiole 2	

Sarcina fiziologică și patologică

Eclampsia (schema 2)	Spitalicească	Analiza generală de sânge Trombocitele Urograma Pierderea proteinelor/24h Biochimia sângelui Transaminazele Coagulograma ECG CTG USG cu Doppler la necesitate Controlul TA Controlul diurezei Consultația oftalmologului Consultația neurologului Consultația internistului	Doza de atac de Sol. Diazepamum 0,5%-2 ml i/v lent, dacă convulsiile reapar, repetați doza de atac.	10 mg	4 fiole	
			Doza de menținere 40mg i/v în 500ml Sol. Natrii chloridum 0,9%, menținând stare de sedatie, dar păstrând conștiința. Nu administrați mai mult de 30ml/h, și mai mult de 100mg/24/h, în caz de depresie respiratorie decurgeți la ventilație asistată. Din momentul stabilizării stării pacientei nu mai târziu de 12h după accesul convulsiv de terminat sarcina. Bumbac Spiritus aethylicus 96%-100ml Seringi Seringi Seringi Sisteme de perfuzii	40mg 500ml 96%-100ml, uz extern 10ml 20ml 5ml	10 fiole 1 fl 100 gr 100ml 5 5 5 1	

Sarcina fiziologică și patologică

CIM, unitatea nozologică	Etapa acordării asistenței medicale	Investigațiile	Tratamentul	Doza/unitatea de măsură	Cantitatea, numărul de prize, pastile, fiole	Durata tratamentului
0.24 Patologia endocrină Diabetul zaharat	spitalicească	Analiza generală de sânge Frotiu la gn USG cu Doppler Glicemia Corpi cetonici în urină Biochimia sângelui Consultația endocrinologului Consultația oftalmologului Urocultura Echilibrul acido-bazic Profilul glicemic Pierderea proteinelor /24h CTG	Insulinum humanum 40 U – 1ml Sol. Natrii hydrocarbonas 4%-200ml Seringi Spiritus aethylicus 96%-100ml Bumbac Sisteme de perfuzii Sol. Acidum ascorbicum %-5ml i/v Sol. Pyridoxinum Sol. Thiamini hydrochloridum	4%-200ml 1ml 100 ml 100 g 1 dată/zi 1 dată/zi 1 dată/zi	3 fl 3 fl 30 buc 100ml 100g 3 8 fiole 8 fiole 8 fiole	8 zile
Hipotireoză	Medicina primară	Consultația endocrinologului ECG Consultația oftalmologului	Compr. Levothyroxinum 0,05	1 compr x 3 ori/zi	24 compr	

Sarcina fiziologică și patologică

036.4 Moartea antenatală, Sarcina oprită în evoluție după 12 săpt.	spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină RW SIDA Frotiu la gn Grupa de sânge. Rh factor ECG USG Coagulograma Protrombina, fibrinogenul	Comp.Mifepristonum 200 mg Compr. Misoprostolum 0,2 Sol. Natrii chloridum 0,9%-500ml Ocitocină 5 UA Plasmă congelată (la necesitate) Spiritus aethylicus 96%-100ml Bumbac Seringi Seringi Sisteme de perfuzie Sol. Metronidazolum 0,5%-100ml Cefazolinum 1,0 Compr. Acidum acetylsalicylicum 0,5 Sol. Methylethylergometrinum 0,02%-3ml Tab.2 Bromocriptinum 5 mg	0,2 pe schemr 0,9%-500 ml 1ml 96%-100ml 100g 5 ml 20 ml 100 ml x 2 ori/zi 1,0 x 3 ori/zi 0,5 i/m o dată/zi ½ tab x2 ori/zi	2 comp 6 compr 1 flac 5 fiole 400 ml 100 ml 100 gr 30 buc 10 buc 2buc 4 fl 9 fi 6 comp 1 fiolă 3 comp	3 zile
0.03 Sarcina oprită în evoluție până la 12 săptămâni	spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină RW SIDA Frotiu la gn Grupa de sânge, Rh factor ECG USG Coagulograma Protrombina, fibrinogenul	Oxytocinum 5 UA Cefazolinum 1,0 Spiritus aethylicus 96%-100ml Bumbac Seringi Seringi Mănuși Tifon Sol. Lidocaini hydrochloridum 2%-2,0 Sol. Natrii chloridum 0,9%-5,0	1 ml x 2 ori/zi 1,0 x 2 ori/zi 100ml 100g 5ml 20ml	6 fiole 6 fl 100ml 100g 30 buc 10 buc 3 perechi 10 m 6 fiole 2 fiole	3zile

Sarcina fiziologică și patologică

036.0 Îngrijiri acordate mamei cu izoimunizare anti-Rh	spitalicească	Analiza generală de sânge Grupa de sânge Rh factor Titrul anticorpi antirezus Urograma USG cu Doppler Amnioscopia	Compr. Dipyridamolum 0,025 Bumbac Spiritus aethylicus 96%-100ml Seringi Anti-Rh γ -globulină	1 compx2 ori/zi 96%-100ml 20 ml 3 ml	10 fiole 10 fiole 16 com 100 gr 100 ml 10 buc 1 doză	8 zile
044.1 Placenta praevia. Iminența de întrerupere a sarcinii	spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină Grupa de sânge, Rh factor Protrombina, fibrinogen USG cu Doppler Timpul coagulării trombocitele	Com. Nifedipinum 0,01 Sol. Etamsylatum 12,5%- 2ml Sol. Dexamethasonum 0,4%-2ml Hexoprenalinum 0,0005%-2ml Compr. Verapamilum 0,04 Sisteme de perfuzii Seringi Seringi Spiritus aethylicus 96%-100ml Bumbac	10 mg x 3 ori/zi 2ml x 2 ori/zi 12 mg x 2 ori 2ml x 1 dată pe zi 1 com.x 4ori/zi 5 ml 10ml 100ml 100g 1compr x 2 ori/zi	21 compr 14 fiole 6 fiole 2 fiole 40 com 5 buc 10 buc 10 buc 100ml 100g 14 compr	7-10zile
0.45 Suspiciu la dezlipirea prematură a placentei normal inserate	spitalicească	Analiza generală de sânge Trombocitele Urograma Grupa de sbnge, Rh factor Protrombina, fibrinogenul USG cu Doppler	Seringi Seringi Bumbac În caz de confirmare a diagnozei, de finisat sarcina în mod urgent prin operație cezariană	10ml 5ml 100g	10 10 100g	

Sarcina fiziologică și patologică

0.20 Voma gravidară	spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină Corpi cetonic în urină RW SIDA Frotiu la gn ECG Amilaza urinei USG organelor interne Biochimia sângelui desfășurată(la necesitate) Amilaza serică	Sol. Metoclopramidum 0,5%-2ml Sol. Natrii chloridum 0,9%-500ml Seringi Seringi Spiritus aethylicus 96%-100ml Bumbac Sol. Pyridoxinum 5%-1ml Sol. Acidum ascorbicum 5%-5ml Sol. Bicarbonat de sodiu 4%-200ml	2ml x 3 ori/zi 0,9%-500ml 10ml 5ml 100ml 100g 5%-1ml 5%-5ml 4%-200ml 1ml x 2 ori /zi, i/m	15 fiole 6 fl 10 buc 10 buc 100 ml 100 g 7 fiole 7 fiole 5 fl 6 fiole	5-7 zile
047.9 Iminența de naștere prematură (22-37 săpt)	spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină RW Frotiu la gn USG, la necesitate cu Doppler	Sol. Dexamethasonum 0,4%-2ml Compr. Acidum acetylsalicylicum 0,325 Tab. Nifedipinum 10mg Compr. Verapamilum 0,04 Sisteme de perfuzii Seringi Seringi Spiritus aethylicus 96%-100ml Bumbac	4mg x 4 ori peste 12h 1 compr/zi 10 mgxori/zi 1 compr x 4 ori/zi 10ml 5ml 100ml 100g 1compr x 3 ori/zi	14 fiole 4 fiole 8 compr. 10 past 32 compr 5 buc 5 buc 100 ml 100 gr 21 compr	7-8 zile

Sarcina fiziologică și patologică

0.20 Iminența de avort la termenul de sarcina 5-22 săpt.	spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină RW Frotiu la gn ECG USG	Compr. Dydrogesteronum 0,01 Com. Acidum folicum 0.001 Com. Sorbifer (Ferrosi sulfas +Acidum ascorbicum) Caps. Progesteronum 0,1 Compr. Acidum acetylsalicylicum 0,325 Caps.Progesteronum 0,2 Seringi	Doza inițială 40 mg apoi 10mg x 3 ori/zi 1x3ori/zi 1x2 ori/zi 100 mg x 3 ori/zi 0,325 1compr/zi 1 caps în vagin x2 ori/zi 10ml 96%-100ml	27 compr. 21 16 24 compr. 5 8 compr. 16 caps 10 buc 100gr 100 ml	7-8 zile
003.3 Avort spontan incipient	spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină RW Frotiu la gn ECG USG	Caps.Progesteronum 0,2 Sol. Etamsylatum 12,5%-2 ml Caps. Progesteronum 0,1 Compr. Acidum acetylsalicylicum 0,325 Seringi Bumbac Spiritus aethylicus 96%-100ml	1 caps în vagin x 2 ori/zi 2ml x 2 ori/zi, i/m 100 mg x 3 ori/zi 1compr/zi 10ml 96%-100ml	14 caps 10 fiole 24 com 8 com 10 buc 100gr 100 ml	7-8 zile
003.3 Avort spontan în evoluție	spitalicească	Analiza generală de sânge Analiza generală de urină RW Frotiu la gn USG	Ocitocinum 5 UA Cefazolinum 1,0 Seringi Seringi Bumbac Sol. Spiritus aethylicus 96%- 100ml	1 ml x 2 ori/zi 1,0 x 2 ori/zi 5 ml 10 ml 100g 100ml	6 fiole 6 fl 15 10 100g 100ml	3 zile

Sarcina fiziologică și patologică

023..5 Infecții urogenitale Trihomoniaza (după 12 săptăm)	Medicina primară și spitalicească	Frotiu la gn Însămânțarea din vagin	Compr. Metronidazolum 0,25	2 compr x 4 ori/zi 1 zi (doza unică 2g)	8 compr	7 zile
			Supp. vag. Metronidazolum 0,25	Câte 1 supp/noapte	5 supp	
			Compr. Metronidazolum 0,25	2 compr x 4 ori/zi 1	8 compr	
Vaginoza bacteriană	Medicina primară	Frotiu la gn Însămânțarea din vagin	Compr. Metronidazolum 0,25	2 compr x 4 ori/zi 1 zi (doza unică 2g în I zi și III-a zi)	16 compr	7 zile
			Supp. vag. Metronidazolum 0,25	Câte 1 supp/noapte	5 supp	
	Spitalicească	Frotiu la gn Însămânțarea din vagin	Compr. Metronidazolum 0,25	2 compr x 4 ori/zi 1 zi (doza unică 2g n I și III-a zi)	16 compr	
			Supp. vag. Metronidazolum 0,25	Câte 1 supp/noapte	5 supp	
Candidoza vaginală	Medicina primară	Frotiu la gn Însămânțarea din vagin	Compr. Nystatinum 500 000 U	1 compr x 4 ori/zi	56 compr	14 zile
	Spitalicească	Frotiu la gn Însămânțarea din vagin	Supp. vag. Nystatinum 500 000 U Compr. Nystatinum 500 000 U Supp.vag. Nystatinum 500 000U	1 supp/noapte 1 compr x 4 ori/zi 1 supp/noapte	10 supp 28 compr 7 supp	
Clamidioză Mycoplasmoză Ureaplasmoză	Medicina primară spitaliceacă	Frotiu vaginal Însămânțarea din vagin Aprecierea Cl. trahomatis, M.hominis, U. urealiticum prin PCR	Compr. Erythromycinum 0,5	1 compr x 4 ori/zi	56 compr	14 zile
			Sau Compr. Amoxicillinum 0,5	1 compr x 3 ori/zi	30 compr	10 zile

Sarcina fiziologică și patologică

Herpes simplex tip I, II (acut primar)	spitalicească	PCR la Herpes simplex II IgM, IgG pentru Herpes simplex II	Sol. Proteflazid (Herba Deschampsia caespitosa L. + Herba Calamagrostis epigeios) 25 ml	I săpt. 5 pic x 3 ori/zi II, III săpt 10 pic x 3 ori/zi IV săpt 15 pic x 3 ori/zi	1fl	1 lună
				1 compr x 5 ori/zi Extern, topic	25 compr 1 tub	5 zile
Herpes simplex tip I, II recidivant (faza de acutizare)	Medicina primară	IgM, IgG pentru Herpes simplex I, II	Sol Proteflazid (Herba Deschampsia caespitosa L. + Herba Calamagrostis epigeios) 25 ml	5 pic x 3 ori/zi – 7 zile 10 pic x 3 ori/zi – II, III săpt 8 pic x 3 ori/zi – IV săpt 8 pic x 3 ori/zi peste 1 zi V, VI săpt 5 pic x 3 ori/zi peste 1 zi 7-8 săpt	1 fl	12 luni
CMV (acut)	Medicina primară	PCR la CMV Ig G, IgM pentru CMV	Sol Proteflazid (Herba Deschampsia caespitosa L. + Herba Calamagrostis epigeios) 25 ml	5 pic x 3 ori/zi – 7 zile 10 pic x 3 ori/zi – II, III săpt 8 pic x 3 ori/zi – IV săpt 8 pic x 3 ori/zi peste 1 zi V, VI săpt 5 pic x 3 ori/zi peste 1 zi 7-8 săpt 1 supp x 2 ori/zi vaginal	1 fl 12 supoz	12 luni 6 zile
Toxoplasmoză	Medicina primară (f. cronică) Spitalicească (f. acută primară sau acutizarea celelalte cronică)	IgM, IgG pentru Toxoplasma gondii Consultația specialistului de la Centrul de toxoplasmă Consultația oftalmologului	Compr. Spiramycinum 3 000 000 UI	1 compr x 2 ori/zi	20 compr	10 zile

Sarcina fiziologică și patologică