

STANDARDELE MEDICALE DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ÎN TRAUMATOLOGIE ȘI ORTOPEDIE PEDIATRICA

	Cifrul	Nozologia	Durata (zile)	Investigații	Tratamentul	Doza (o dată)	Cantitatea
1.	M 87.0	Maladia Pertes	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Broșe		4
				Analiza biochimic ă a sîngelui	Placă metalică		1
				ECG	Aparat gipsat		25-30
				Radiografia	Tifon		20
				Cons. Fizioterapeut	Vată		400,0
				Scintigrafia osoasă	Pansamente		5
					Seringi	2 ml	30
					Perfuzii		2
					Sol. Glucoză 5%	200 ml	7
					Cefazolină 1,0	1,0	10 fl
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefuroxim 0,75	0,75	10 fl
					Seringi	5 ml	10
					Plasmă	200 ml	
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fempiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil, ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Metamizol sodic 50% - 2 ml	2 ml	5 fiole

					Sol. Diphenhidramină 1% - 1ml	1 ml	5 fiole
					Cui		1
2.	M 91.1	Epifizoliză juvenilă a capului osului femoral	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Broșe		4
				Analiza biochimică a sîngelui	Cui		1
				ECG	Aparat gipsat		25-30
				Radiografia	Tifon		20
				Cons. Fizioterapeut	Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	2 ml	30
					Perfuzii		2
					Sol. Glucoză 5%	200 ml	7 fl
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefuroxim 0,75	0,75	10 fl
					Seringi	5 ml	10
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Metamizol sodic 50% - 2 ml	2 ml	5 fiole

					Sol. Diphenhidramină 1% - 1ml	1 ml	5 fiole
					Cui		1
3.	Q 65.8	Coxa vara - Coxa valga	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Broșe		4
				Analiza biochimică a sîngelui	Cui		1
				ECG	Aparat gipsat		25-30
				Radiografia	Tifon		20
				Cons. Fizioterapeut	Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	2 ml	30
					Perfuzii		2
					Sol. Glucoză 5%	200 ml	7 fl
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefuroxim 0,75	0,75	10 fl
					Seringi	5 ml	10
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fempiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Metamizol sodic 50% - 2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Diphenhidramină 1% - 1ml	1 ml	5fiole

4.	O 76.3 Q 76.4	Scolioza și deformități ale coloanei vertebrale	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Fixator Cotrell - Debouset		1
				Analiza biochimică a sîngelui	Alcool etilic 70%	300 ml	
				ECG	Aparat gipsat		25-30
				Radiografia	Tifon		20
				Cons. Fizioterapeut	Vată		400gr
				TC	Pansamente		5
				RMN	Seringi	2 ml	30
				Scintigrafia pulmonară	Perfuzii		2
				USG Cord	Sol. Glucoză 5%	200 ml	7 fl
				USG organelor interne	Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefuroxim 0,75	0,75	10 fl
					Seringi	5 ml	20
					Discus Compozitus fiole (homeopate)	2,2 ml	5 fiole
					Traumel S fiole (homeopate)	2,2 ml	5 fiole
					Metilprednisolon	500mg	1fl
					Traumel, pasta (homeopate)	50g	1tub
					Traumel, ung (homeopate)	50gr	1tub
					Sol Magneziu sulfat 25% -5ml	5ml	10 fiole
					Sol. Tiamină 5%-1ml	1 ml	10 fiole
					Sol. Piridoxină 5%-1ml	1 ml	10 fiole
					Sol. Acid Nicotinic 1%-1ml	1 ml	10 fiole
					Sol. Ergocalciferol 12 500 UI	1 ml	10 fiole
					Sol. Acid ascorbic 5%-2ml	2 ml	10 fiole
					Sol. Solcoseril	2 ml	10 fiole

					Sol. Neostigmină 0,05%-1 ml	1 ml	10 fiole
					Sol. Inozină 2%-5ml	5 ml	10 fiole
					Sol. Piracetam 20%-5ml	5 ml	10 fiole
					Sol. Lidocaină 2%-2ml	2 ml	10 fiole
					Sol. Prednizolon 3%-1ml	1 ml	5 fiole
					Sol. Vinpocetină 0,5%-2ml	2 ml	10 fiole
					Sol. Furosemid 1%-2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Acetazolamidă 250 mg	comprimate	10
					Catetere periferice		10
					Sol. Metronidazol 0,5%-100ml	100ml	4fl
					Cefuroxim 0,75	0,75	10fl
					Fluturașe		2
					Sol. Metamizol sodic 50% - 2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Diphenhidramină 1% - 1ml	1 ml	5 fiole
					Ceftazidim 1,0 (rezerva)	5ml	10 fiole
5.	Q 76.7, Q 76.8, Q 76.9	Deformitatea cutiei toracice	11 zile				
				Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml	
				Analiza biochimică a sîngelui	Tifon	5 m	
				ECG	Aparat gipsat		10
				Radiografia	Tifon		10
				Spirografia	Vată		400gr
				Cons. Fizioterapeut	Pansamente		5
				USG Organelor interne	Seringi	5 ml	20
				TC 3D Cutiei toracice	Perfuzii		2
				USG Cordului	Sol. Glucoză 5%	200 ml	7 fl
				Scintigrafia pulmonară	Cefazolină 1,0	1,0	10fl
				Consultația Cardiologului	Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole

					Cefuroxim 0,75	0,75	10 fl
					Plasmă	200 ml	
					Placa metalica		1
					Broșe		10
					Fixatoare		70
					Sol.Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Metamizol sodic 50% - 2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Diphenhidramină 1% - 1ml	1 ml	5 fiole
6.	Q66.0,Q69.9	Picior strâmb congenital	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		4
				Cons. Fizioterapeut	Tifon		10
					Vată		200gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	15
					Broșe	1	
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole

					Broșe		10
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10 fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10 fl
					Rezerva (Cefalosporina G III)		10 fl
					Paracetamol supp 80mg	80mg	10 supp.
					Paracetamol Suspensie	2,5ml	1 fl
7.	Q68.0,	Torticolis muscular	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		15
				Cons. Fizioterapeut	Tifon		10
					Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	5ml	10
					Sol. Metamizol 50%-2 ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Metamizol de	5 ml	5 fiole

					sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml		
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
					Sol. Lincomicină 30%-1ml	1 ml	10 fiole
8.	Q73.8	Ectromielie	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		15
					Tifon		10
					Vată		200gr
					Pansamente		5
					Seringi	20ml	10
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Aparat Ilizarov		3 inele
					Broșe		10
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole

					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxeutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
9	Q71.3	Ectromielie	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		15
					Tifon		10
					Vată		200gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	10
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Gentamicină 4%-2ml	2ml	10 fiole
10.	Q73.8	Ectromielie, aparatul Ilizarov	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat Ilizarov		
					Tifon		10

					Broșe		8
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Gentamicină 4%-2ml	2ml	10 fiole
11.	Q 69. Q 70.0- Q 70.9	Sindactilii, polidactilii	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		2
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	pastile	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl

					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
12.	D 16.0- D 16.9	Tumori benigne ale ţesuturilor moi	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenţia chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		15
					Tifon		10
					Vată		200 gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
13.	D 16.0- D 16.9	Tumori osoase- rezeccii marginale	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenţia chirurgicală		

				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		15
				TC	Tifon		10
				Scintigrafia	Vată		200 gr
				RMN	Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1 tub
					Heparină ung 25,0	1	1 tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10 fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10 fl
14.	D 16.0- D 16.9	Tumori osoase- rezectii marginale cu aloplastie	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		15

				TC	Tifon		10
				Scintigrafa	Vată		200 gr
				RMN	Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fempiverină 5 ml	5 ml	5
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
15.	Q 72.4, Q 75. Q72.6	Inegalitatea membrelor	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat Ilizarov		4 inele
				Cons. Fizioterapeut	Tifon		10
					Broșe		8
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20

					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenviverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
16.	Q 74	Maladia Madelung	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat Ilizarov		4 inele
					Tifon		10
					Broșe		8
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de	5 ml	5 fiole

					fenpiverină 5 ml		
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
17	Q 74.0	Sinostoza radioulnară	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		5
				Cons. Fizioterapeut	Tifon		10
					Broșe		4
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	pastile	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub

					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10 fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10 fl
18	Q 78.9	Procese displastice- osteotomii	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		15
				Cons. Fizioterapeut	Tifon		10
					Broșe		4
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl

					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
19	Q 74.1	Luxatiile pateleii	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		20
				Cons. Fizioterapeut	Tifon		10
					Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenviverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
20	Q 95.9	Deformații poliomielitice-tenotomii	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	

				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		20
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
					Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Broșe		10
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fempiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
21	Q 95.9	Deformități postosteomielitice și după poliomielită-osteotomii ⁹	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		20

				Cons. Fizioterapeut	Tifon		10
					Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Broșe		10
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fempiverină 5 ml	5 ml	5fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
22	Q 95.9	Deformități postosteomielitice și după poliomielită-artrodeze triple a piciorului	11 zile				
				Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		10
				Cons. Fizioterapeut	Tifon		10

					Vată		400gr
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Broșe		10
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fempiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
23	G 80.0-G 80.9	Paralizie cerebrală infantilă-tenoplastie	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Cons. Fizioterapeut	Aparat gipsat		15
					Tifon		10
					Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de	5 ml	5 fiole

					sodiu+Petofenonă+Bromură de fempiverină 5 ml		
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
24	G 80.0- G 80.9	Paralizie cerebrală infantilă-ahiloplastie	11 zile	Analiza generală a sîngelui			
				Analiza generală a urinei	Intervenția chirurgicală		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Anestezia		
				ECG	Alcool etilic 70%	100 ml	
				Cons. Fizioterapeut	Tifon	5 m	
					Aparat gipsat		15
					Tifon		10
					Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fempiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole

					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
25	G 80.0- G 80.9	Paralizie cerebrală infantilă- osteotomii	11 zile				
				Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Cons. Fizioterapeut	Aparat gipsat		30
					Tifon		10
					Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Broșe		10
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub

					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
26	Q 74.0 Q74.2 Q74.1 Q 74.8-	Deformități superioare și inferioare axiale a segmentelor și membrelor Alte deformatii ale membrelor	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		30
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
					Vată		400gr
					Broșe		4
					Cui metalic		1
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fempiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub

					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
27	Q 65.5- Q 66.6	Deformitate plat valgus de picior	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		10
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
					Vată		400gr
					Broșe		2
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl

28	Q74.4	Ahondro-plazia	11 zile	Analiza generală a sângelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		10
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
					Vată		400gr
					Broșe		2
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fempiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
29	Q78.0	Osteogeneza imperfectă-osteotomii	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	

				Radiografia	Aparat gipsat		10
					Tifon		10
					Vată		400gr
					Broșe		2
					Cui metalic		1
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenviverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
30	M 79.2	Brahioplexită	11 zile	Analiza generală a sângelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		10
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
					Vată		400gr
					Broșe		2
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20

					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxeutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
31	Q 74.3	Artrogripoză, picior strâmb	11 zile	Analiza generală a sângelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		4
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
					Vată		200gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	15
					Broșe	1	
					Intervenția chirurgicală		
					Anestezia		
					Alcool etilic 70%	100 ml	
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole

					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
32	Q 74.3	Artrogripoză, luxație de șold	11 zile	Analiza generală a sângelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Broșe		4
				ECG	Cui		1
				Radiografia	Aparat gipsat		25-30
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		20
					Vată		400gr
					Pansamente		5
					Seringi	2 ml	30
					Perfuzii		2
					Sol. Glucoză 5%	200 ml	7fl
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Cefuroxim 0,75	0,75	10fl
					Sol. Baralgină	5 ml	5 fiole
					Seringi	5 ml	10
					Plasmă	200 ml	
					Sol. Metamizol de	5 ml	5

					sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml		
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
33	Q 79.9	Pseudoartroze congenitale	11 zile	Analiza generală a sângelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat Ilizarov		
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
				Scintigrafia osoasă	Broșe		8
				RMN	Pansamente		5
				TC	Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub

					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
34	M 25.9	Redoare posttraumatică antebrațului-operații de reconstrucție	11 zile	Analiza generală a sângelui			
					Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		10
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
					Vată		400gr
					Broșe		2
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole

					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
35	M 20	Os tibialis extern	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Sol. Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Radiografia	Aparat gipsat		12
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
					Vată		200gr
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fempiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
36	M 29	Hallus valgus	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	

				Radiografia	Aparat gipsat		12
				Cons. Fizioterapeutului	Tifon		10
					Vată		200gr
					Broșă		2
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	20
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Lincomicină 30%-1 ml	1ml	10 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxeutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
					Broșa		10
37	M 20	Maladia Notta	3 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Cons. Fizioterapeutului	Aparat gipsat		20
					Tifon		5
					Pansamente		2
					Seringi	2ml	5
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole

					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub
					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
38	T 23- T 24	Consecințele arsurii cu redoarea degetelor	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Intervenția chirurgicală		
				Analiza generală a urinei	Anestezia		
				Grupa sanguină, Rh-factor	Alcool etilic 70%	100 ml	
				ECG	Tifon	5 m	
				Cons. Fizioterapeutului	Aparat gipsat		20
					Tifon		10
					Pansamente		5
					Seringi	2ml	10
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole
					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Comp. Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxerutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1tub

					Heparină ung 25,0	1	1tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10fl
39	M 40 M 41 Q 76.3 Q 77.7 Q 65.8 Q 65.0 M 91.1 M 16	Patologia coloanei vertebrale și articulațiilor mari la tratament de recuperare		Analiza generală a sîngelui	Masaj		10
				Analiza generală a urinei	Parafină		10
				Cons. Fizioterapeutului	Electrostimulații		10
				Cons. Reabilitologului	Reduceri de subluxații		10
				TC	Exstenzii		10
				Spirografie	Gimnastica curativă		10
				Scintigrafie pulmonară	Masaj		10
					Parafină		10
					Electrostimulații		10
					Reduceri de subluxații		10
					Exstenzii		10
					Gimnastica curativă		10
					Masaj		10
	Q 65.8	Ablația construcțiilor metalice	11 zile	Analiza generală a sîngelui	Anestezia		
				Analiza generală a urinei	Alcool etilic 70%	100 ml	
				Grupa sanguină, Rh-factor	Tifon	5 m	
				ECG			10
				Radiografia	Pansamente		5
					Seringi	2ml	10
					Sol. Metamizol 50%-2ml	2 ml	6 fiole
					Sol. Difenhidramină 1%-1ml	1 ml	6 fiole

					Sol. Metamizol de sodiu+Petofenonă+Bromură de fenpiverină 5 ml	5 ml	5 fiole
					Sol. Diazepam 0,5% - 2ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Clorpromazină 2,5% -2ml	2 ml	5 fiole
					Meloxicam 7,5 mg	comprimate	3
					Troxeutin, ung 40,0	1	1 tub
					Cloranfenicol + Metiluracil ung 40,0	1	1 tub
					Heparină ung 25,0	1	1 tub
					Sol. Acid ascorbic 5% -2 ml	2 ml	5 fiole
					Sol. Papaverină 2%- 2ml	2 ml	5 fiole
					Cefazolină 1,0	1,0	10 fl
					Ceftriaxon 1,0	1,0	10 fl

NOTĂ Antibiotic de rezervă

Fortum 1gr. La consultăția medicilor specialiș ti examinarea adăugătoare și tratamentul indicat de specialist conform standartelor maladiiei depistate.