

STANDARDELE
MEDICALE
DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
ÎN OTORINOLARINGOLOGIE PEDIATRICĂ

CIM* Unitatea nozologică	Etapa acordării asistenței medicale	Denumirea comună internățională a investigațiilor	Număru l investiga țiilor	Tratamentul: substanța/ manopera	Doza, unita tea de măsu ră	Numărul de prize/comp rimate/ fiole/flacoa ne recomandat	Durata tratamen tu lui recoman dat (zile)
H 74 Otita medie recidivantă	a) urgență prespitalicească	Otoscopia optică	1	Comp. Paracetamolum 250 mg	250 mg x 3 ori pe zi	2250 mg	3 zile
		Examenul general Semne meningiene	1	Phenazonum + Lidocainum 10 ml	2 - 3 picăt. x 3 ori pe zi	1 flacon	3-4 zile
		Cons ORL	1	Sol. Naphazolinum 0,05%-10ml	2 picăt. x 3ori pe zi	1 flacon	6 zile
		Transportare la spitalizare	1	Comp. Ampicillinum 250 mg	250 mg x 3ori pe zi	2750 mg	7 zile
	b) medicală primară	investigații clinice specifice maladiei: Otoscopia optică	1	Amoxicillinum + Kalii clavulanas 457 mg	457 mg x 2 ori pe zi	1 flacon	7 zile
		Examenul general Semne meningiene	1	Comp. Chloropyraminum 25 mg	½ compr. x 2 ori pe zi	0,5 g	7 zile
		Cons ORL	1	Sol. Naphazolinum 0,05% - 10 ml	2 picăt. x 3ori pe zi	1 flacon	6 zile
		investigații paraclince:	1	Comp. Paracetamolum	250mg x 3	2250 mg	3 zile

		Audiometria		250 mg	ori pe zi		
		Hemograma Sumarul urinei	1	Phenazonum + Lidocainum 10 ml	2 - 3 picăt x 3 ori pe zi	1 flacon	3-4 zile
	c) specializată de ambulator	investigații clinice specifice maladiei		Comp. Paracetamolum 250 mg	250mg x 3 ori pe zi	2250 mg	3 zile
		Otoscopia optică Rino – și orofaringoscopia	1 1	Amoxicillinum + Kalii clavulanas 457 mg	457 mg x 2 ori pe zi	1 flacon	7 zile
		Cons pediatrului Semne meningiene	1	Comp. Chloropyraminum 25 mg	½ compr. x 2 ori pe zi	0,5 g	7 zile
		investigații paraclinice	1	Phenazonum + Lidocainum 10ml	2 - 3 picăt x 3 ori pe zi	1 flacon	3zile
		Audiometria	1	Sol. Naphazolinum 0,05% - 10ml	2 picăt x 3ori pe zi	1 flacon	6 zile
		Hemograma Sumarul urinei	1	Acetylcysteinum 100 mg	100 mg x 3 ori pe zi	30 pac.	10 zile
		Frotiu din CAE la flora	1				
	d) spitalicească	investigații clinice specifice maladiei		Comp. Paracetamolum 250 mg	250mg x 3 ori pe zi	2250 mg	3 zile

		Otoscopia optică Rino – și orofaringoscopia	1	Cefotaximum 1,0	500 mg x 2 ori pe zi	10 flacoane	10 zile
		Cons. pediatrului Semne meningiene	1	Comp. Chloropyraminum 25 mg	½ compr. x 2 ori pe zi	0,5 g	7 zile
		investigații paraclinice	1	Comp. Acetylcysteinum 100 mg	100 mg x 3 ori pe zi	30 pac.	10 zile
		Audiometria Impedansmetria	1	Sol. Naphazolinum 0,05% - 10ml	2 picăt x 3ori pe zi	1 flacon	6 zile
		Frotiu din CAE la flora	1	Phenazonum + Lidocainum 10ml	2 - 3 picăt x 3 ori pe zi	1 flacon	3zile
				Sol. Ciprofloxacinum 10 ml	2 pic. x 4 ori pe zi	2 fiole	10 zile
				Sol. Hydrocortisonum – 2 ml	2 pic. x 4 ori pe zi	4 fiole	10 zile
				Miringotomia, Anestezia generală, timpanostomia, anestezia generală			
H 65.0 Otita medie exsudativă	a) urgență prespitalicească						

	b) medicală primară	investigații clinice specifice maladiei: Otoscopia optică Examenul general Cons ORL investigații paraclinice: Audiometria	1				
	c) specializată de ambulator	investigații clinice specifice maladiei	1	Cefotaximum 1,0	500 mg x 2 ori pe zi	10 flacoane	10 zile
		Otoscopia optică Rino – și orofaringoscopia	1	Comp. Sulfametoxazol+ Trimetoprim 480 mg	240 mg x 2 ori pe zi	10 compr.	10 zile
		Cons. pediatrului Cons. alergologului	1	Comp. Acetylcysteinum 100 mg	100 mg x 3 ori pe zi	30 pac.	10 zile
		investigații paraclinice	1	Comp. Chloropyraminum 25 mg	½ compr. x 2 ori pe zi	0,5 g	7 zile
		Audiometria	1	Sol. Naphazolinum 0,05%-10ml	2 picăt x 3ori pe zi	1 flacon	6 zile
		Hemograma Sumarul urinei	1				
	d) spitalicească	investigații clinice specifice maladiei		Timpanostomia, Adenotomia, anestezia generală			3 zile
		Otoscopia optică Rino – și orofaringoscopia	1	Sol. Ciprofloxacinum 10 ml	2 pic. x 4 ori pe zi	2 fiole	3 zile

		Cons. pediatrului	1	Sol. Hydrocortisonum – 2 ml	2 pic. x 4 ori pe zi	4 fiole	3 zile
		investigații paraclinice					
		Audiometria Impedansmetria	1				
H 66.1 H 66.2 Otita medie cronică supurată	a) urgență prespitalicească	Otoscopia optică Examenul general Examenul neurologic (semne meningiene)	1				
		Cons ORL Transportare la spitalizare	1	Transportare la spitalizare			
	b) medicală primară	investigații clinice specifice maladiei: Otoscopia optică Examenul general Examenul neurologic (semne meningiene) Cons ORL	1				
		investigații paraclinice: Audiograma Hemograma Sumarul urinei	1				
	c) specializată de ambulator	investigații clinice specifice maladiei	1	Sol. Nitrofuralum 1:5000 – 500 ml	2 ml x 4 ori pe zi	60 ml	10 zile
		Otoscopia optică Rino – și	1	Sol. Ciprofloxacinum 0,3%- 10 ml	2 pic. x 4 ori pe zi	2 fiole	10 zile

		orofaringoscopia					
		Cons. pediatrului Cons. alergologului	1	Sol. Hydrocortisonum – 2 ml	2 pic. x 4 ori pe zi	4 fiole	10 zile
		investigații paraclinice	1				
		Audiometria	1				
		Hemograma Sumarul urinei	1				
		Trimitere la spitalizare		Trimitere la spitalizare			
	d) spitalicească	investigații clinice specifice maladiei		Cefotaximum 1,0	500 mg x 2 ori pe zi	10 flacoane	10 zile
		Otoscopia optică Rino – și orofaringoscopia	1	Chloropyraminum	½ compr. x 2 ori pe zi	0,5 g	7 zile
		Cons. pediatrului	1	Comp. Acetylcysteinum 100 mg	100 mg x 3 ori pe zi	30 pac.	10 zile
		investigații paraclinice	1	Sol. Naphazolinum 0,05%-10ml	2 picăt x 3ori pe zi	1 flacon	6 zile
		Audiometria Impedansmetria	1	Antromastoidotomia, anestezia generală			
		Hemograma Sumarul urinei ECG	1	Attico-antromastoido- tomia, anestezia generală			
		Frotiu din CAE la flora	1	Evidarea totală a procesului petromastoidian, anestezia generală			
			1	Timpanoplastia,			

		Hemograma		anestezia generală			
		Sumarul urinei	1	Deschiderea abcesului, anestezia generală			
		ECG	1	Sol. Ciprofloxacinum 0,3%- 10 ml	2 pic. x 4 ori pe zi	2 fiole	10 zile
		Consultația pediatrului	1	Sol. Hydrocortisonum – 2 ml	2 pic. x 4 ori pe zi	4 fiole	10 zile
J31	a) urgență						
Faringita	prespitalicească						
	b) medicală	investigații					
	primară						
		Hemograma	1				
		Sumarul urinei	1	Gargarisme cu Sol. Natrii hydrocarbonas	100 ml 3 ori pe zi	1500ml	5
		Faringoscopia	1				
		Antibioticograma	1				
		Consultul pediatrului	1				
		Consultul stomatologului	1				
		Consultul gastrologului	1				
		Consultul endocrinologului	1				
		Cons. fizioterapeutului	1				
	c) specializată	investigații					
	de ambulator						
		Rinoscopia optică	1				
		Faringoscopia	1				
		Radiografia sinusurilor paranazale	1				

				Gargarisme cu Sol. Natrii hydrocarbonas	100 ml 3 ori pe zi	1500ml	5
				Badijonajul mucoasei cu Iodinol 100 ml	10 ml 2 ori pe zi	1400 ml	7
				Asanarea căilor respiratorii superioare			
	d) spitalicească	investigații					
J.35.2 Hipertrofia vegetațiilor adenoide	a) urgență prespitalicească						
	b) medicală primară	investigații					
		Hemograma	1	Sol. Naphazolinum 0,05%-10ml	2 picăt. x 3ori pe zi In nas	1 flacon	6 zile
		Biochimia sângelui	1				
		Sumarul urinei	1				
		Narinoscopia	1				
		Radiografia rinofaringelui lateral	1				
		Consultul pediatrului	1				
		Consultul stomatologului	1				
	c) specializată de ambulator	investigații					
			1				

		Hemograma					
		Sumarul urinei	1	Sol. Naphazolinum 0,05%-10ml	2 picăt x 3ori pe zi	1 flacon	6 zile
		Rinoscopia	1				
		Faringoscopia	1				
		Otoscopia	1				
		Consultul pediatrului	1				
		Consultul stomatologului	1				
		Radiografia sinusurilor paranazale	1				
	d) spitalicească	investigații					
				Adenotomia			2-3 zile
				Sol. Naphazolinum 0,05%-10ml	2 picăt x 3ori pe zi	1 flacon	2 zile
		Rinoscopia optică	1	Comp. Paracetamolum 250 mg	250 x2 ori pe zi	15 comp.	2 zile
		Faringoscopia Audiometria	1	Amoxicillinum per/os 250 mg	250 mg 3 ori pe zi	21 comp.	3
		Otoscopia	1				
		Radiografia sinusurilor paranazale	1				
		ECG	1				
		Consultul pediatrului	1				
J02 Angina acută	a) urgență prespitalicească						
	b) medicală primară	investigații	1				

			1				
		Hemograma	1	Comp. Paracetamol 250mg	250 mg x 3 ori/zi	15 comp.	5
		Sumarul urinei	1	Comp. Diphenhydraminum 0,05	0,05 2 ori pe zi	2	2
		Rinoscopia anterioară	1				
		Faringoscopia	1	Comp. Amoxicillinum per/os 250 mg	250 mg 3 ori pe zi	21 comp.	7
		Cultura microbiană și antibioticograma	1				
	c) specializată de ambulator	investigații					
		Hemograma	1				
		Sumarul urinei	1	Comp. Paracetamol, oral 250 mg	250 mg x 3 ori/zi	15 comp.	5
		Rinoscopia optică	1	Comp. Diphenhydraminum 0,05	0,05	2	1
		Faringoscopia	1			1	7
		ECG	1	Comp. Amoxicillinum per/os 250 mg	250 mg 3 ori pe zi	21	7
		Consultația pediatrului	1				
		Consultația ORL Cultura microbiană și antibioticograma	1				
Adenoidita acută	a) urgență prespitalicească						
	b) medicală	investigații					

	primară						
		Hemograma	1				
		Sumarul urinei	1	Comp. Paracetamolum 250 mg	250 mg x 3 ori/zi	15 mg	5
		Rinoscopia anterioară	1	Comp. Diphenhydraminum 0,05	0,05 mg x 1 pe zi	0,05	1
		Faringoscopia	1				
			1	Susp. Amoxicillinum + Kalii clavulanas	457mg/5ml x 2 ori pe zi	4570 mg	5
				Sol. Naphazolinum 0,05%-10ml	2 picăt x 3ori pe zi	1 flacon	6 zile
	c) specializată de ambulator	investigații					
		Hemograma	1				
		Sumarul urinei	1	Paracetamolum 250 mg	250 mg x 3 ori/zi	15 comp.	5
		Rinoscopia anterioară	1	Diphenhydraminum 0,05	0,05 x 1 pe zi	0,05	1
		Faringoscopia	1				
		ECG	1	Comp. Amoxicillinum per/os 250 mg	250 mg 3 ori pe zi	21 comp.	7
			1	Sol. Naphazolinum 0,05%-10ml	2 picăt x 3ori pe zi	1 flacon	6 zile
Faringomicon za	a) urgență prespitalicească						
	b) medicală primară						

		Cons. ORL	1				
		Hemograma	1	Gargarisme cu Sol. Natrii hydrocarbonas	100 ml 3 ori pe zi	1500ml	5
		Sumarul urinei	1	Badijonajul mucoasei cu Iodinol 100 ml	10 ml 2 ori pe zi	1400 ml	7
		Rinoscopia anterioară	1				
		Faringoscopia	1				
		ECG	1				
		Cultura din faringe la microbi și ciuparcă	1				
	c) specializată de ambulator	investigații					
				Comp. Fluconazolum 50 mg	50 mg 1 pe zi	3 compr.	3
		Hemograma	1	Gargarisme cu Sol. Natrii hydrocarbonas	100 ml 3 ori pe zi	1500 ml	5
		Sumarul urinei	1	Badijonajul mucoasei cu Sol. Iodinol 100 ml	10 ml 2 ori pe zi	1400 ml	7
		Rinoscopia anterioară	1	Gargarisme cu Sol. Hexetidinum 0,1%-10ml	10 ml /zi 2 ori pe zi	140 ml	7
		Faringoscopia	1				
		ECG	1				
		Cultura din faringe la microbi și ciuparcă	1				
Trauma faringiană	a) urgență prespitalicească			Hemostază			
				Sol. Trimeperidinum 1%-2ml	1 ml i/m	1amp	1

	b) medicală primară	investigații					
				Comp. Cefotaximum 1,0	500 mg x 2 ori pe zi	5 flacoane	5 zile
		Hemograma	1	Sol. Trimeperidinum 1%-2ml	1 ml.x 1 ori pe zi	1 ml.	1
		Sumarul urinei	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml	4 mg. x 1 ori pe zi	1 mg.	1
		Rinoscopia anterioară	1				
		Faringoscopia	1				
		ECG	1				
	c) specializată de ambulator	investigații	1				
		Hemograma	1	Sol. Trimeperidinum 1%-2ml	1 ml.x 1 ori pe zi	3 ml.	3
		Sumarul urinei	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml	4 mg x 1 ori pe zi	12 mg	3
		Rinoscopia anterioară	1				
		Faringoscopia	1				
		ECG	1				
		Cons.fizioterapeutului	1				
			1				
	d) spitalicească	investigații	1				
		Hemograma	1	Sol. Trimeperidinum 1%-2ml	1 ml.x 1 ori pe zi	3 ml.	3
		Sumarul urinei	1	Sol. Dexamethasonum 0,4%-1ml.	4 mg x 1 ori pe zi	12 mg	3

		Rinoscopia anterioară	1	Traheotomia			
		Faringoscopia	1	Anestezia			
		ECG	1	Cefotaximum 1,0	1 gr x 2 ori pe zi	14 gr	7
		Cons.fizioterapeutului	1				
C11	a) urgență	Transportarea la	1	Hemostază			
Angiofibrom	prespitalicească	spitalizare					
	b) medicală	investigații	1				
	primară						
		Consultația ORL	1				
		Consultația pediatrului					
		Radiografia	1				
		rinofaringelui					
		Analiza gen. a sîngelui	1				
		Analiza gen. a urinei	1				
	c) specializată	investigații	1				
	de ambulator		1				
			1				
		1. Hemograma	1				
		2. Sumarul urinei	1				
		3. Tomografia	1				
		computerizată					
		5. Endoscopia optică	1				
	d)spitalicească						
		investigații					
		1.Hemograma	1	Ablația tumorii			

		2. Sumarul urinei	1	Anestezie generală			
				Ampicillinum i.m.	1 gr x 3ori/zi	15 gr	5
		3.Endoscopia optică	1	Diphenhydraminum 0,05	0,05 x 1 ori pe zi	0,15	3
		4. Tomografia Computer	1				
			1	Plasmă			
				Masă eritrocitară			
T17.4 T17.5 Corpi straini traheo- bronhici	a) urgență prespitalicească	Transportare la spitalizare	1				
	b) medicală primară	investigații clinice specifice maladiei:	1				
		investigații paraclinice:	1				
		Transportare la spitalizare					
	c) specializată de ambulator	investigații clinice specifice maladiei		Spitalizare urgentă în secțiile ORL pneumologie			
		Hemograma	1				

		Urina sumară	1				
		investigații paraclinice					
		R-grafia cutiei toracice	1				
		ECG	1				

	d) spitalicească	investigații clinice specifice maladiei	1	Traheobronhoscopia superioară			
				Anestezie generală			
				Comp. Cefotaximum 500 mg.	500 mg 2 ori pe zi	15 flac	
				Seringi	1 buc. 5 ml	16	
				Bromhexinum	5ml	15 prize	
		investigații paraclinice	1	Comp. Loratadinum	5 mg	15 prize	
				Sol. Dexamethasonum 0,4%-1 ml	4 mg	2 prize	
				Traheotomie (la necesitate)		1	
T17.3 Corpi straini laringieni	a) urgență prespitalicească	Anamnestic, Examen clinic general	1	Procedeul Heimlich, dacă pacientul nu vorbește Transportare de urgență la spital			
	b) medicală primară	investigații clinice specifice maladiei:	1	Transportare de urgență la spital			
		Anamnestic, Examen clinic general	1				
		investigații paraclinice:	1				

	c) specializată de ambulator	investigații clinice specifice maladiei					
		Anamnesic, Examen clinic general Laringoscopia indirectă	1	Laringoscopia directă cu extragerea corpului străin, Transportare de urgență la spital în caz de nereușită, Conicotomie la indicații vitale			
		investigații paraclinice	1				
	d) spitalicească	investigații clinice specifice maladiei	1				
		Laringoscopia directă	1	Extragerea corpului străin	1		
		R-grafia regiunii cervicale	1	Traheotomie (la necesitate)	1		
		investigații paraclinice	1	Anestezie generală	30 min		
		Hemograma	1				
		Urina sumară	1				
		ECG	1				
J04.2 Laringotraheita acută stenoizantă a copilului	a) urgență prespitalicească			Sol. Dexamethasonum 0,4%-1 ml	4 mg		

(Falsul crup)							
		Cons ORL Transportarea la spitalizare		Sol. Furosemidum 1%- 1ml	1 ml		
				Sol. Diazepamum 0,5%-2ml	1 ml		
	b) medicală primară	investigații clinice specifice maladiei:					
		investigații paraclinice:					
	c) specializată de ambulator	investigații clinice specifice maladiei					
		investigații paraclinice					
	d) spitalicească	investigații clinice specifice maladiei		Comp. Cefotaximum 0,5	500 mg x 2 ori pe zi	14 flacoane	7 zile
		Laringoscopia directă	2	Sol. Dexamethasonum 0,4%-1 ml	4mg x 2 ori pe zi	6 fiole	3 zile
		Radiografia cutiei toracice	2	Sol. Furosemidum 1% 1 ml	1 ml	3 fiole	3 zile
		investigații paraclinice		Sol. Diazepamum 0,5%- 2 ml	1 ml	3 fiole	3 zile
		Hemograma	2	Comp. Ketotifenum 1mg	½ compr. x 2 ori pe zi	7 comp.	7 zile
		Urina sumară	1				
		Cons. fizioterapeutului	1				
		ECG	1				
		Indicii biochimici	1				

		Cons.pediatrului	1	Intubație prelungită sau traheotomie (la agravare)			
		Cons.reanimatologului	1				
J.37.0 Laringita cronică hipertrofică Laringita cronică pseudomixomatoasă	a) urgență prespitalicească						
	b) medicală primară	investigații clinice specifice maladiei:					
		investigații paraclinice:					
	c) specializată de ambulator	investigații clinice specifice maladiei					
		Fibrolaringoscopia	2				
		Microlaringoscopia	1				
		Stroboscopia	2				
		Citologia	1				
		Examen histologic	1				
		investigații paraclinice					
		Hemograma	1				
		Cons. fizioterapeutului	1				
		Urina sumară	1				

	d) spitalicească	investigații clinice specifice maladiei		Ablația formațiunii la microlaringoscopia suspendată	1 procedură		
		Cons. fizioterapeutului	1	Anestezie generală	30 min		
		investigații paraclinice					
J 38.1 Polip al corzilor vocale, J 38.7 Chist, angiom laringian; J38.2 Noduli vocali spinoși	a) urgență prespitalicească						
	b) medicală primară	investigații clinice specifice maladiei:					
		investigații paraclinice:					
	c) specializată de ambulator	investigații clinice specifice maladiei					
		Laringoscopia	1				
		investigații paraclinice					
	d) spitalicească	investigații clinice specifice maladiei		Ablația formațiunii la microlaringoscopia suspendată	1 procedură		
		Microlaringoscopia	1	Anestezie generală	30 min	.	
		Examen histologic al piesei extrase					
		investigații paraclinice					
		Hemograma					

		Urina sumară					
		ECG					
D 14.1 Papilomatoz a recidivantă a laringe lui a copilului	a) urgență a) a) prespitalicească						
		Transportare spre spitalizare					
	b) medicală primară	investigații clinice specifice maladiei: Examen clinic general					1
		investigații paraclinice: Hemograma Sumarul urinei					
	c) specializată de ambulator	investigații clinice specifice maladiei					1
		Examen ORL Laringoscopia directă	1				
		investigații paraclinice: Hemograma Sumarul urinei	1				
	d) spitalicească	investigații clinice specifice maladiei		Microlaringoscopia suspendată cu ablația papiloamelor	1		3-4
		Microlaringoscopia	1	Anestezie generală			
		investigații paraclinice		Cefazolinum 500-	250-500 mg	4	2 zile

				1000mg	2 ori pe zi i/m, i/v	flacoane	
		Hemograma Examen histologic	1	Ceftriaxonum 1,0	500 mg 1 data pe zi i/m,i/v	2 flacoane	2 zile
		Urina sumară	1				
		ECG	1				
J 01 Sinusită acută		Transportare spre spitalizare					
	b) medicală primară	investigații clinice specifice maladiei:					
		1.Hemograma		Comp.Paracetamolum, 250 mg	250 mg x 3 ori/zi	comprimate	5
		2.Sumarul urinei		Comp.Diphenhydramin um 0.05 mg	0,05 x 2 ori pe zi	2	2
		3.Radiografia sinusurilor parnazale		Comp. Amoxicillinum per/os 250 mg	250 mg 3 ori pe zi	21 comp.	7
		Cons.fizioterapeutului	1	Sol. Naphazolinum 0,05% 10 ml pic. în nas	2 - 3 picăt. flacon	3 ori pe zi	5
	c) specializată de ambulator	investigații clinice specifice maladiei					
		1.Hemograma		Comp. Paracetamolum 250 mg	250mg x 3 ori pe zi		3 zile
		2.Sumarul urinei		Comp. Diphenhydraminum 0,05	0,05	2	1

		3.Radiografia sinusurilor paranazale		Comp. Amoxicillinum per/os 250 mg	250 mg 3 ori pe zi	21 comp.	7
		4.Examenul bacteriologic al conținutului sinusal		Sol. Naphazolinum 0,05%-10ml pic. în nas	2 - 3 picăt, flacon	3 ori pe zi	5
		Cons. fizioterapeutului	1				
		5.Consultația alergologului					
	d) spitalicească						
		1. Hemograma					
		2. Sumarul urinei		Comp. Paracetamolum 250 mg	250 mg x 3 ori pe zi	15 comp.	3 zile
		3.Radiografia sinusurilor paranazale		Diphenhydraminum 0,05	0,05	2	1
		4. Endoscopia optică		Comp. Amoxicillinum per/os 250 mg	250 mg 3 ori pe zi	21 comp.	7
		5.Examenul bacteriologic al conținutului sinusal		Sol. Naphazolinum 0,05%-10 ml picături nazale. în nas	2 - 3 picăt, flacon	3 ori pe zi	5
		Cons. fizioterapeutului	1				
		6.Consultaț alergologului					
J 34.0 Furun-cul nazal	a) urgență prespitalicească	Examenul general Bilanț ORL	1	Paracetamolum 0,25	125- 250mg x 3 – 4 ori pe zi	4 compr. sau 1 flacon sau 3 suppozit.	1

				Sol. Ketoprofenum 100mg/2ml	50 mg x 2 i/m	2 flacon	1
				Sol. Cefotaximum 500 mg	250-500 mg x 2-3 i/m	2 flacon	1
	b) medicală primară	investigații clinice specifice maladiei: Examenul general Examenul extern nazal Narinoscopia Cons. ORL investigații paraclinice: Hemograma Sumarul urinei	1	Sol. Cefotaximum 500 mg	250 – 500 mg x 2ori pe zi i/m, i/v	2 flacon	1
				Sol. Ketoprofenum 100mg/2ml	50 mg x 2 i/m	2 flacon	
				Comp. Chloropyraminum 25mg	25 mg x 2	10 compr. 1 flacon	
	c) specializată de ambulator	investigații clinice specifice maladiei		Sol. Cefotaximum 500 mg	250-500 mg x 2 ori pe zi i/m	14 flacoane	7
		Examen ORL Rinoscopia Cons pediatriului Cons.fizioterapeutului	1	Comp. Paracetamolum 0,25 Sirop Paracetamolum 120 mg/5 ml	125 -250mg x 3 – 4 ori pe zi	10 compr. sau 1 flacon	3
				Comp. Amoxicillinum	125 – 500	30 compr.	7

				+ Kalii clavulanas 125 mg (250mg, 500mg)	mg 3-4 ori/zi	sau 1 flacon	
				Comp. Cefalexinum (250mg, 500mg) Susp. Cefalexinum 125 mg/5ml	125 – 500 mg 2-3 ori/zi	3 ori pe zi, 30 compr. sau 1 flacon	7
				Comp. Chloropyraminum 25mg	25 mg x 2 ori	14 compr	7
				Sol. Ketoprofenum 100mg/2ml	50 mg x 2 ori i/m	1 flacon	3
		investigații paraclinice					
		Hemograma Sumarul urinei					
		Trimitere la spitalizare					
	d) spitalicească	investigații clinice specifice maladiei					7-8
		Examen ORL Rinoscopia Cons. pediatrului					
		Cons. fizioterapeutului	1	Comp. sau supozitoare Paracetamolum 125-250 mg Sirop Paracetamolum 120 mg/5 ml	125- 250mg x 3 – 4 ori pe zi	10 compr. sau 10 supozit.	3

				Cefazolinum 500 mg	250 - 500 mg, 2-3 ori/zi	16 flacoane	7- 8
				Cefotaximum1,0	500 - 1000 mg, 2-3 ori/zi	16 flacone	7- 8
				Sol. Ketoprofenum 5%-2ml	50 mg x 2 i/m	6 flacon	3
				Comp. Chloropyraminum 25 mg	25 mg. 2 ori/zi	20 compr.	7- 8
		investigații paraclinice					
		Hemograma Sumarul urinei ECG Frotiu din plagă la flora și sensibilitate la antibiotice Cons. anesteziologului	1	Deschiderea furunculului abcedant, anestezie generală			
J 34.2 Deviația septului nazal	a) urgență prespitalicească						
	b) medicală	investigații clinice					

	primară	investigații specifice maladiei: Examenul general Cons ORL investigații paraclinice: Hemograma Sumarul urinei					
	c) specializată de ambulator	investigații clinice specifice maladiei					
		Rinoscopia Evaluarea respirației nazale Hemograma Sumarul urinei	1				
		investigații paraclinice pentru tratament chirurgical					
		Hemograma, timpul de coagulare, durata sîngerării Sumarul urinei Analize biochimice: protrombin, fibrinogen, bilirubina trei fracții, AST, ALT, ureia, potasiu, sodiu Grupa sanguină Rhfactor MRS după 15 ani	1				

		Hbs Ag ECG Radiografia nasului și sinusurilor paranazale, la necesitate					
		Trimitere la spitalizare					
	d) spitalicească	investigații clinice specifice maladiei					4-5
		Rinoscopia Endoscopia nazală Rinomanometria și rinometria acustică, la necesitate CT nasului și sinusurilor paranazale, la necesitate Cons pediatrului Cons anesteziologului	1	Cefazolinum 500mg Cefotaximum1,0	500 - 1000 mg 2-3 ori/zi 0,5-1,0 2 ori pe zi	8-10 flacoane 8-10 flacoane	
		investigații paraclinice		Comp. Chloropyraminum 25mg	25 mg. 2 ori/zi	20 compr.	
		Hemograma și sumarul urinei, la necesitate	1	Sol. Naphazolinum 0,05%-10ml în nas	2 - 3 picăt, 3 ori/zi	1 flacon	
				Septoplastia, Anestezia generală			
				Sol. Ketoprofenum 100mg/2ml	50 mg x 2 i/m	1 flacon	

Șef clinică ORL
Profesor universitar

M.Maniuc