

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

**STANDARDE MEDICALE
DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT
ÎN STOMATOLOGIE TERAPEUTICA**

CHIȘINĂU, 2017

CIM* Unitatea nozologică	Etapă acordării asistenței medicale	Denumirea comună internățională a investigațiilor	Investigații paraclinice	№ inves- ti- gațiilor or	Tratamentul: medicamente/mano- pera	Doza (în pastila/ fiola/ flacon) și unitatea de măsură	Consumabile	Durata Tratament- ului Recomand- at
K 002 Carie dentară	Urgență specializat ă de ambulator	• Examinul pacienților primari • Colectarea anamnezei • Determinarea indicelui igienic • Prepararea cavităților carioase • Redarea formei anatomice a dintelui prin obturație	• Consultația medicului Terapeut • Consultația medicului endocrinolog • Radiografia dinților • Determinarea EOD	1 1 1 1	• Anestetice Sol. Ubistezin 4%, septonest 2%, scnadinest (fără adrenalină) Lidocaină 10% spray • Antiseptice Sol. Peroxid de Hidrogen 3% Sol. Hipoclorid de Na 0,2% • Materiale de obturație • Preparate de Fluor Ftorodent Ftor lac Gel. Ultra Ez Belac, fisurit	2ml Se administrează local La prelucrarea medicamentoasă a cavităților carioase Se administrează sub formă de aplicații, gel.	• Manusi • Măști • Preparate anestetice • Antiseptice • Roberdam • Rulouri de coton • Material de obturație: Dradia-Direct, Genial,Charism a, Estet-x,SDR- unidoze, Genial flow	2-30 zile • Restabilir ea forme anatomice a dintelui

K03 K 03.2 K 03.1 Afecțiuni de origine necarioasă ale dinților	Ambu lator	• Examenul pacienților primari • Colectarea anamnezei • Determinarea indicelui igienic • Înalbirea dentară • Fluorizarea locala • Terapia remineralizantă	• Consultația medicului Terapeut • Consultația medicului endocrinolog • Determinarea EOD	1 1 1	• Anestetice Sol. Ubistezin 4%, septonest 2%, scnadinest (fără adrenalină) Lidocaină 10% spray • Antiseptice Sol. Peroxid de Hidrogen 3% Sol. Furacilină • Preparate cu conținut de calciu Calciu gluconat Calciu glicerogofat Calciu lactate • Preparate cu conținut de fluor Gel Ultra Ez • Preparate remineralizante Belac	Aplicativă Se administrează topic Prelucrarea sectoarelor afectate 1X3 ori pe zi 10 zile Se administrează sub formă de aplicații ori per os cite 05g 2, 3 ori pe zi timp de 3, 4 săptămâni	• Manusi • Măști • Preparate anestetice • Antiseptice • Materiale stomatologice • Soluție remineralizantă Sol. Ca gluconat 10%, Belac	• 2-30 zile Până la 6 luni - Restabilirea funcției dintelui
--	---------------	--	--	---------------------	--	--	---	--

		• Obturarea permanent a canalelor radiculare • Redarea formei anatomice a dintelui prin obturație			• Antiinflamatoare Tab. Nimesulid Tab. Ibuprofen+ Paracetamol • Analgetice Dexalgin, Ibuprofen, MIG 400	O pastilă la durere O pastilă la durere		
K05 K05.3 K05.4 K06.8 Boala parodontală (Afecțiunile parodontiului marginal)	Ambulator	• Examenul pacienților primari • Colectarea anamnezei • Determinarea statusului parodontal ce include: indicii de igienă, de placă și tartru dentar, indicele de sângerare, mobilitate dentară, leziuni de furcație, profunzimea pungilor	• Consultația medicului Terapeut • Consultația ortodontului • Consultația ortopedului • Consultația medicului endocrinolog • Consultația medicului hematolog • Consultația medicului Imunolog, • Investigații bacteriologice	1 1 1 1	• Anestetice topice Lidocain Spray 10% Sol. Articaină • Tratamentul complex ✓ Conservativ ✓ Chirurgical ✓ Ortopedic ✓ Ortodontic • Antiseptice Sol. Hydrogen peroxid 3% Sol. Tirothricină + Chlorhexidină gluconat 0,06%, sol Betadină 1-3% Sol. Hexetidină	Aplicativă 0,2 mg Prelucrarea sectoarelor afectate	• Manusi • Măști • Preparate anestetice • Antiseptice	În funcție de entitatea nozologică (gingivită, parodontită marginală) 1 săptămână – 1-2-4 luni

					• Complex polivitamine • Tramament chirurgical ✓ Chiuretaj (deschis, închis) ✓ Operații cu lambou ✓ Gingivotomie, gingivoectomie ✓ Frenuloplastie ✓ Lărgirea vestibulului oral • Tratament orthodontic și orthopedic • Șinarea dinților			
K 13. K12 Afecțiunile mucoasei bucale	Ambulator	• Examenul pacienților primari • Colectarea anamnezei • Determinarea indicelui igienic • Asanarea	• Consultația medicilor: - terapeut - endocrinolog - dermatolog - hematolog - imunologului • Investigații	1 1 1 1 1	• Anestetice Lidocaină 10% sprai • Antiseptice Sol. Furacilină Sol. Hydrogen peroxid 3%	Aplicativ Pentru prelucrarea medicamentoasă a sectoarelor afectate	• Manusi • Măști • Preparate anestetice • Antiseptice	20-30

		cavității bucale • Înlăturarea factorilor iritanți	bacteriologice		•Preparate ale enzimelor Sol. Trepșină 2% • Antibiotice Ung. Levomicol Ung.Eritromicină • Antivirale Ung. Fluorocortul Ung. Oxolină 1% Ung. Virolex Ung. Aciclovir • Antihistamine • Preparate antimicotice Ung.ClotrimazolCom p. Fluconazol • Preparate keratoplastice Ulei de cătină Ulei de măcieș Caratolin • Complex polivitamine	Se administrează topic Se administrează topic în sectoarele afectate O pastila în 5 zile Se administrează topic 1Xde 3 ori pe zi, 10 zile.		
--	--	---	----------------	--	---	--	--	--

K14 Afecțiuni și anomaliile limbii	Ambulator	• Examenul pacienților primari • Colectarea anamnezei. • Determinarea indicelui igienic • Asanarea cavității bucale • Înlăturarea factorilor iritanți	• Consultația medicilor: -terapeut - endocrinolog - hematolog • Investigații imunologice, bacteriologice • Radiografia panoramică • Asanarea cavității bucale • Analiza generală a sîngelui • Analiza generală a urinei • Glucoza • Investigații bacteriologice din focarul de infecție • Citologie	• Anestetice topice Lidocaină spre 10% • Antiseptice Sol. Hydrogen peroxid 3% Sol. Iod + Kalium iodid • Antibiotice Comp. Amoxicilină + Acid clavulanic 625mg Comp. Metronidazol 480 mg • Antifungice Comp. Fluconazol • Preparate keratoplastice Ulei de măcieș, Catină albă • Complex polivitamine	Aplicativă Prelucrarea sectoarelor afectate 1x3 ori pe zi 5 zile Cîte o pastilă la 7 zile Aplicativ 1x de 3 ori pe zi timp de 10 zile		
---	-----------	---	---	---	--	--	--

Sef catedră, prof. universitar

Sergiu Ciobanu