



**O R D I N**  
mun. Chișinău

„22 „ iulie 2022

nr. 723

**Cu privire la aplicarea dozei booster 2  
de vaccin anti-COVID-19**


În scopul susținerii procesului de imunizare anti-COVID-19, în vederea reducerii morbidității și mortalității provocate de COVID-19, în conformitate cu Planul Național de imunizare anti-COVID-19 aprobat spre implementare prin Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.93/2021, în conformitate cu recomandările Comitetului Național Consultativ de Experti în domeniul Imunizărilor și în temeiul Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2021,

**ORDON:**

1. Se introduce aplicarea **dozei booster 2** de vaccin anti-COVID-19, începând cu 25 iulie 2022.
2. Categoriile eligibile pentru doza booster 2 de vaccin anti-COVID-19, sunt:
  - 1) persoanele care prezintă risc sporit de a face forme grave de COVID-19 (anexa nr. 1);
  - 2) persoanele din categoriile profesionale cu risc major de infectare și categoriile profesionale cu risc sporit de transmitere a infecției (anexa nr. 2);
  - 3) persoanele sever imuno-compromise cu vârstă de 18 ani și peste (anexa nr. 3).
3. Doza booster 2 de vaccin anti-COVID-19 se administrează la un interval de **cel puțin 4 luni** de la administrarea dozei booster 1, cu aplicarea următoarelor scheme de vaccinare, în dependență de tipul vaccinului utilizat:
  - 1) conform anexei nr. 4, pentru toate categoriile eligibile, cu excepția persoanelor sever imuno-compromise;
  - 2) conform anexei nr. 5, în cazul persoanelor sever imuno-compromise.
4. În cazul persoanelor eligibile pentru doza booster 2, care au fost recent testați pozitivi pentru COVID-19, următoarea doza de vaccin se administrează după rezolvarea completă a simptomelor și expirarea perioadei de autoizolare; intervalul recomandat este de 3 luni după infectare.
5. Administrarea dozei booster 2 de vaccin anti-COVID-19 se va aplica inclusiv persoanelor eligibile care au fost vaccinate peste hotarele țării.
6. Persoanele cu vârstă de 18 ani și mai mult, care nu se regăsesc în categoriile persoanelor eligibile, pot primi doza booster 2 de vaccin anti-COVID-19 dacă solicită, la un interval de cel puțin 4 luni de la administrarea dozei booster 1, cu menținerea priorității pentru imunizare a categoriilor de persoane menționate la p.2.

7. Agenția Națională pentru Sănătate Publică va asigura ajustarea Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19), cu includerea modulului pentru doza booster 2.
8. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice, departamentale și private vor:
  - 1) aduce prezentul ordin la cunoștință personalului implicat în procesul de imunizare împotriva COVID-19;
  - 2) asigura evidența și raportarea vaccinării cu vaccinurile anti-COVID-19, inclusiv administrarea dozelor booster 2 în Sistemul informațional automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19” (SIA RVC-19).
9. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Svetlana Nicolaescu, secretar de stat.

Ministrul



Ala NEMERENCO

**Persoanele care prezintă risc sporit de a face forme  
grave de COVID-19**

- 1) Adulții cu vârstă mai mare de 60 de ani;
- 2) Persoanele cu comorbidități (cu vârstă de 18 ani și mai mult);
- 3) Femeile gravide și cele care alăptează (cu vârstă de 18 ani și mai mult);
- 4) Beneficiarii din cadrul instituțiilor rezidențiale de îngrijire și centrelor de plasament temporar sau de lungă durată.

**Persoanele din categoriile profesionale cu risc major de infectare și categoriile profesionale cu risc sporit de transmitere a infecției (cu vârstă de 18 ani și mai mult)**

- 1) Personalul din instituțiile medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare;
- 2) Personalul din categoriile profesionale cu risc sporit de transmitere a infecției:
  - a) personalul din cadrul instituțiilor rezidențiale de îngrijire, centrelor de plasament temporar sau de lungă durată;
  - b) personalul din cadrul serviciilor sociale;
  - c) personalul din domeniul de educație;
  - d) angajații structurilor de menținere și asigurare a ordinii publice, apărării și securității statului.

**Persoanele sever imuno-compromise**

- 1) Pacienți oncologici (tumori maligne solide și hematologice) în tratament activ (chimioterapie, radioterapie, terapie moleculară/biologică și alți agenți biologici care sunt clasificați ca imunosupresori sau imunomodulatori);
- 2) Pacienți oncologici în stadii avansate de boală, cu sau fără tratament activ anterior (radioterapie, chimioterapie, terapie moleculară, terapie imunosupresoare);
- 3) Pacienți post-transplant de organe solide cu sau fără tratament imunosupresor;
- 4) Pacienți cu transplant de celule stem hematopoetice cu sau fără tratament imunosupresor;
- 5) Pacienți cu imunodeficiențe severe cauzate de imunodeficiențe primare, congenitale (ex: sindromul DiGeorge, Sindrom Wiskott-Aldrich, etc) și dobândite, respectiv;
- 6) Pacienți cu infecție HIV în orice stadiu, fără tratament sau în stadiu de SIDA ( $CD4 < 200$  mmc), cu sau fără tratament antiretroviral;
- 7) Pacienții cu imunodeficiență secundară cauzată de administrarea unui tratament imunosupresor: radioterapie; chimioterapie: (agenții chimioterapici pentru cancer sunt clasificați ca imunosupresori severi);
- 8) Pacienții ce urmează terapii biologice (moleculară, celulară): cu anticorpi monoclonali, anticorpi bispecifici, CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T), bloanți TNF, etc;
- 9) Pacienții ce urmează tratament cu cortizon și cu produse derivate administrate sistemic: tratament activ cu doze mari ( $> 20$  mg prednison sau echivalentul pe zi când se administrează mai mult de 2 săptămâni);
- 10) Pacienții ce urmează alte terapii cu efecte imunosupresoare (ex: remisive sintetice convenționale, remisive sintetice țintite).

**Schema de vaccinare care se va aplica pentru administrarea dozei booster 2 de vaccin anti-COVID-19 pentru toate categoriile eligibile, cu excepția persoanelor sever imuno-compromise**

Denumirea vaccinului	Schema primară completă de vaccinare	Doza booster 1 de vaccin anti-COVID-19 termen de administrare este de 4 luni după schema completă, excepție este vaccinul Janssen pentru care termenul de administrare este de la 2 luni, Sionovac și Sinopharm pentru care termenul de administrare este de la 3 luni.	Doza booster 2 de vaccin anti-COVID-19 ( termenul de administrare este de 4 luni după booster 1)
<b>Comirnaty Pfizer/ BioNTech</b>	2 doze cu interval de 21 de zile	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)
<b>Moderna</b>	2 doze cu interval de 28 de zile	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)
<b>Vaxzevria (Astra Zeneca)</b>	2 doze cu interval de 28-84 de zile	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml) sau Vaxzevria (Astra Zeneca) (0,5 ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)
<b>Janssen Johnson &amp;Johnson</b>	1 doză	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml) sau Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)
<b>Gam-COVID-Vac (Sputnik V)</b>	2 doze cu interval de 21 de zile	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml) sau Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)
<b>CoronaVac (Sinovac)</b>	2 doze cu interval de 28 zile	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml) sau Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml) sau CoronaVac (Sinovac) (0,5 ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)
<b>Sinopharm</b>	2 doze cu interval de 21 de zile	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml) sau Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml) sau Sinopharm (0,5 ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)

**Schema de vaccinare care se va aplica la administrarea dozei booster 2, persoanelor cu vârstă de 18 ani și mai mult, care sunt considerate sever imuno-compromise**

Denumirea vaccinului	Schema primară completă de vaccinare	Doza suplimentare de vaccin anti-COVID-19 Termen de administrare (la interval de cel puțin 28 de zile după schema primară)	Doza booster 1 de vaccin anti-COVID-19 termen de administrare este de 4 luni după doza suplimentară, excepție este vaccinul Janssen pentru care termenul de administrare este de la 2 luni, Sionovac și Sinopharm pentru care termenul de administrare este de la 3 luni.	Doza booster 2 de vaccin anti-COVID-19 (termenul de administrare este de 4 luni după booster 1)
Comirnaty Pfizer/ BioNTech	2 doze cu interval de 21 de zile	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)
Moderna	2 doze cu interval de 28 de zile	Moderna (Spikevax) (0,5 ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)
Vaxzevria (Astra Zeneca)	2 doze cu interval de 28-84 de zile	Vaxzevria (Astra Zeneca) (0,5 ml) sau vaccin ARNm (Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3ml) sau Moderna/Spikevax (0,5ml))	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml) sau Vaxzevria (Astra Zeneca) (0,5 ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)
Janssen Johnson &Johnson	1 doză	nu se administrează doza suplimentară	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml) sau Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)
Gam-COVID-Vac (Sputnik V)	2 doze cu interval de 21 de zile	Sputnik Lite (0,5 ml) sau vaccin ARNm (Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,5 ml)).	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml) sau Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)
CoronaVac (Sinovac)	2 doze cu interval de 28 zile	CoronaVac (Sinovac) (0,5ml) sau vaccin ARNm (Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3ml) sau Moderna/Spikevax (0,5ml))	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml) sau Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml) sau CoronaVac (Sinovac) (0,5 ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)
Sinopharm	2 doze cu interval de 21 de zile	Sinopharm (0,5 ml) sau sau vaccin ARNm (Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,5 ml)).	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml) sau Janssen Johnson&Johnson (0,5 ml) sau Sinopharm (0,5 ml)	Comirnaty Pfizer/BioNTech (0,3 ml) sau Moderna/Spikevax (0,25ml)